



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 160 F. Régisseur Receites D.R.A.F. CCP DIJON 35 00 28 D.

BOURCIONE HEADON COMIE

80.22.19.38 I

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin nº 23 - 12 octobre 1989

COLZA

- Charançon du bourgeon terminal *Premières captures*

- Altises Peu de captures

CEREALES

Pucerons Intervenir dès que le seuil est atteint

COLZA

CHARANCONS DU BOURGEON TERMINAL

Situation: Les premières captures ont été enregistrées dès le 4 octobre en de très rares postes Chaux Norges et Beaune (21). Clamecy (58) Fouchère (89)

Préconisation : Dans les seules zones où des captures ont été enregistrées, un traitement pourra être envisagé à partir du 16 octobre

Seul le Baythroïd 0,3 l a reçu une autorisation de vente contre le charançon du bourgeon terminal par association d'usage, il est encore possible d'utiliser une des nombreuses spécialités autorisées sur charançon de la tige La dose charançon de la tige est en général, un peu plus élevée que la dose altise

___ ALTISES

Situation: Le vol se poursuit mais faiblement

Préconisation: Un traitement contre les altises seules n'est en général pas justifié. Un éventuel traitement contre le charançon du bourgeon terminal pourra contribuer à éliminer les adultes encore présents

CEREALES

PUCERONS et JAUNISSE NANISANTE

Situation: Sur les parcelles qui commencent à lever, on observe déjà des taux parfois important d'infestation.

Au cours de nos tournées, nous avons pu observer quelques parcelles d'orge et de blé au stade 2ème feuille pointante avec des infestations entre 10 et 15 %.

Préconisation: Intervenir rapidement dès que 10 à 20 % des pieds sont porteurs de pucerons.

P35